


| | | |
|---|----------------------------|--|
| شماره سند: RW-FO-08 شماره بازنگری: ۰۲ تاریخ بازنگری: ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | عنوان سند : پیام آموزشی |  بیمارستان مهر ملایر |
|---|----------------------------|--|

آنتروپیوم :

حرکت لبه پلک به سمت داخل می باشد که مانع ورود مایع اشک به کانال های اشکی می شود و خشکی چشم و التهاب مزمن به دنبال دارد، به این علت پزشک به شما پیشنهاد عمل جراحی می کند.

چگونه این عمل انجام می شود؟

در این عمل پوست و ماهیچه در پلک بالا بریده شده و چربی اضافه که موجب پف پلک شده خارج می شود. بعد از عمل زخم با یک نخ بخیه بسیار ظریف بخیه می شود تا درآینده جای زخم مشخص نباشد

چه عوارضی بعد از عمل می تواند وجود داشته باشد؟

خونریزی و کبودی پوست دور چشم به خاطر خونریزی ضعیف شدن قدرت دید بخصوص در روزهای اول که چشمها ورم دارند تحریک موقت چشم توسط مواد ضد عفونی کننده ورم دور چشم که تا سه روز اوج می گیرد و از روز چهارم دوباره کم می شود ، معمولا با بالا رفتن سن بهبودی زخمها زمان بیشتری نیاز دارند

عفونت و گاهی نیاز به عمل مجدد

به چه مواردی باید بعد از عمل دقت کرد؟

- * تا یک روز پس از عمل پلک رانندگی نکنید.
- * اگر ورم دور چشم روز به روز زیاد می شود و یا لبه پلک از کره چشم فاصله دارد و یا چشم به صورت کامل بسته نمی شود. این موارد در ۴ روز اول عادی هستند.
- * خروج بدون اختیار اشک از گوشه چشم موقتی است. در بعضی افراد ممکن است روزهای اول دید چشم واضح نباشد، این به دلیل ورم است.
- * پوستی که ورم میکند خارش دارد که می توان با چرب کردن مثلا با پماد جنتاماسین چشمی برطرف کرد.
- * دوش گرفتن از روز بعد از عمل مانعی ندارد.
- * استفاده از کمپرس سرد و خنک کردن محل عمل ساعتی یک مرتبه و هر مرتبه ۱۰ ثانیه تورم را کم می کند که باعث جلوگیری از کبودی و تسکین دهنده می باشد.
- * از خم کردن صورت به جلو در ۴ روز اول پرهیز شود.