



بیمارستان مهر ملایر

عنوان سند:

پیام آموزشی

شماره سند: RW-FO-08

شماره بازنگری: ۰۲

تاریخ بازنگری: ۱۳۹۹/۱/۱۰

درمان انسداد مجرای اشکی با پروبینگ (میل زدن) در کودکان:

شرح عمل: عمل پروبینگ یک روش جراحی است که حدوداً ۱۰ دقیقه طول می کشد و یک پروب نازک و فلزی از داخل مجرای اشکی بسته عبور داده می شود تا انسداد را برطرف کند.

روشهای درمانی:

داروها: اگر تشخیص پزشک عفونت باشد، ممکن است قطره چشم آنتی بیوتیک یا قرص تجویز کند.

پروبینگ مجرای اشک: روشی است که برای درمان انسداد مجرای اشک استفاده می شود. مجرای اشک مسدود شده باعث عفونت مکرر چشم و اشک بیش از حد می شود. پس از آزمایش کامل چشم، چشم پزشک در صورت نیاز جراحی پروبینگ را برای او انجام خواهد داد.

معمولاً کودک باید بعد از جراحی به مدت ۱ تا ۳ ساعت در بیمارستان بماند. عوارض جانبی مانند حالت تهوع نیز ممکن است رخ دهد.

مراقبت های بعد از جراحی: پزشک پس از عمل جراحی قطره های آنتی بیوتیک یا پماد را تجویز می کند.

معمولاً بعد از این عمل کودکان درد ندارند. با این حال، ممکن است خسته باشند و کمی بی قراری کنند. ممکن است پس از جراحی، کودک حالت تهوع و استفراغ داشته باشد. اشک و ترشحات بینی ممکن است با خون ترکیب شود.

رژیم غذایی و فعالیت: بیمار باید با یک رژیم غذایی مایع مانند آب شکر، مایعات، نوشیدنی بدون گاز، ژله، آب سیب، نوشیدنی ساده و یا شیر مادر شروع شود. همانطور که قدرت تحمل کودک بیشتر می شود می توان رژیم غذایی را تغییر داد. به طور کلی بعد از جراحی پروبینگ هیچ محدودیتی برای فعالیت وجود ندارد.

