

| | | |
|---------------------------|-------------|--|
| شماره سند: ED-FO-01 | عنوان سند: |  بیمارستان مهر ملایر |
| شماره ویرایش: 01 | پیام آموزشی | |
| تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | | |

عنوان: مواردی که ممکن است در کمبود آنزیم G6PD باعث لیز گلبول های قرمز خون شوند :

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ** سایر داروها ** | ** ضد انگل ها ** | ** آنتی بیوتیک ها ** |
| استا نیلید | نیریدازول | ایزونیازید |
| آنالوگ های ویتامین K | استیوفن | دایسون |
| پروبنسید | بتا نفتول | سیپروفلوکساسین |
| دی مر کاپرول | | نالیدیکسیک اسید |
| فنازوپریدین | ** بیماریها ** | نورفلوکساسین |
| گلوکوسولفون | اسیدوز دیابتی | کلرامفنیکل |
| گلی بن کلامید | سپسیس (عفونت خون) | نیتروفورانتوئین |
| | هپاتیت | |
| ** داروهای ضد التهاب ** | | ** ضد مالاریاها ** |
| آسپرین (اسید سالیسیلیک اسید) | | پریماکین |
| فنیل بوتازون | ** مواد شیمیایی ** | پاماکین |
| فناستین | فنیل هیدرازین | کلروکین |
| | بنزن | کوئین آقرین |
| | ۲و۴ و ۶تری نیتروتولون (TNT) | پنتا کین |
| ** گیاهان ** | تولوئیدن بلو | |
| دانه های باقلا | نفتالین | ** ضد سرطان ها ** |
| حنا | متیلن بلو | رازبوریکاز |
| | | دوکسوروبیسین |
| | | |

- ۱- والدین گرامی: کمبود آنزیمی کودک خود را به پزشک اطلاع دهید تا پزشک در خصوص تجویز دارو تصمیم بگیرد.
- ۲- در صورتی که پزشک معالج در شرایط خاص مصرف یکی از داروهای فوق را لازم بداند باید علائم هشدار دهنده بیماری مانند: ادرار تیره، زردی یا رنگ پریدگی پوست مد نظر باشد.
- ۳- مادر شیرده نیز باید از مصرف مواد داروها و فوق پرهیز کند.
- ۴- نوع خاصی از کمبود آنزیم G6PD به نام فاویسم وجود دارد که به صورت حاد با مصرف باقلا ایجاد می شود.
- ۵- حنا به مقدار زیاد و استفاده طولانی مدت (مانند تاتو کردن و رنگ کردن موی سر) باعث لیز می شود.

گرد آورنده: خانم دکتر ظهیری متخصص اطفال و نوزادان